福建省1999年通过审定的蔬菜新品种

1 厦花杂交4号花椰菜

厦花杂交4号系福建省厦门市农业科学研究所育成的花椰菜一代杂种。花球圆整紧实,单球质量1.5～2.0 kg,品质较好,成熟一致,采收期集中。中熟,定植后70～75 d(天)采收;丰产,一般每667 m^2产量2 000～3 000 kg。比厦花80天2号增产42.5 %。1992～1997年在全国12个省市推广面积1 066 hm^2,比各地常规主栽品种增产23.5 %,较同类熟性品种提早采收7～10 d(天),表现出田间成苗率高,生长势强,适应性强等杂种优势。播种期7月中～8月下旬,苗龄25～30 d(天),每667 m^2定植2 200株左右,定植成活后7～10 d(天)中耕松土;现蕾期前以尿素、复合肥为主,追施2～3次,现蕾后以尿素、钾肥为主。

2 绿宝青花菜

绿宝系厦门市农业科学研究所杂交配制的青花菜一代杂种。株高55～58 cm,花茎高30～33 cm,开展度85～92 cm,外叶数11～13片,叶面较平展,蜡粉多,最大叶片长44～50 cm,宽22～25 cm,主花球直径16～18 cm,扁圆,蕾中等大小,花球商品性好,单球质量350 g左右。早熟,定植后55～60 d(天)采收,一般每667 m^2产量800～900 kg,较抗黑腐病和病毒病,较耐热。1995～1998年在福建、云南、四川、湖南、广西等省区累计推广467 hm^2。可作早秋及秋季栽培,闽南地区8月上旬～9月下旬为播种适期,育苗移栽,苗龄25～28 d(天),每667 m^2定植2 700～2 800株。主花球采收后,加强管理,花茎中下部可再生3～4个侧花球。

郑旋 李宇
(福建省种子总站 福州 350003)

来稿摘登

温州塑料大棚茄子越冬栽培技术

茄子越冬栽培应选择耐低温和弱光的品种,在温州地区以杭茄1号为佳。播种期以9月上旬比较适宜。播种后30 d(天)假植到营养钵,再过20～30 d(天)定植于大棚,苗龄50～60 d(天)。

温州地区在12月下旬至翌年2月上旬应注意保温。要求定植时覆盖地膜,并根据天气寒冷程度设置1～3层覆盖,即大棚、中棚和小拱棚。如果遇到长时间阴雨雪天、强冷空气南下时,晚上在中棚外再盖1层遮阳网或干燥的草帘。同时在两栋大棚之间用小拱棚种植秋冬蔬菜,以减少大棚边际过多的热量散发。为了扩大保温效果,还常采用加宽和延长大棚的方法。

温州地区冬春气温低,空气湿度大,应及时整枝摘叶,以加强通风透光、降低棚内空气湿度、减少病虫害的发生。

徐坚 刘辉 黄承贤 叶利勇
(温州市蔬菜科学研究所 325005)

© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net