贸市场，运往各地。其他产品主要销往湖北监利、石首、仙桃、荆州以及福建、深圳、上海等地。近年来，农民通过种业合作组织和注册品牌，统一收购、包装、净菜上超市，有的还利用网络进行销售，价格比同期市场价翻一番，有很大的发展前景。

2.2 蒌蒿的栽培模式 目前，蔡甸区蒌蒿的栽培模式主要有3种。通过不同的耕作和轮作模式，既可获得较高的经济效益、又可减少病害的发生。

2.2.1 蒌蒿—小西瓜栽培模式 选择云南绿秆蒌蒿，超甜小西瓜选用早春红玉、万福来等。7月初定植蒌蒿，8月中旬、9月中旬、11月中旬分别采收3批。如需供应元旦、春节市场，加盖小拱棚后继续采收1～2批。后茬的小西瓜一般在翌年1月初播种，2月下旬定植，4月上旬坐果，5月上旬成熟，6月中旬采收完毕。

蒌蒿—小西瓜栽培模式，在当地已推广应用多年，取得了良好的经济效益。超甜小西瓜每667 m^2产量为2 000 kg，产值3 000元；蒌蒿每667 m^2总产量3 400 kg（前4批），产值11 000元；每667 m^2总产值14 000元。

2.2.2 蒌蒿—春黄瓜栽培模式 选择云南绿秆蒌蒿，春黄瓜品种主要选用津优10号、津优1号、津绿1号、津绿2号等。在蒌蒿采收后期，进行春黄瓜播种育苗，一般在2月上中旬播种黄瓜，3月上旬定植，4月中旬～6月中旬采收黄瓜。

每667 m^2黄瓜产量约3 500 kg，产值3 500元；蒌蒿总产量为3 400 kg（前4批），产值11 500元；每667 m^2总产值15 000元。

2.2.3 蒌蒿—早苦瓜栽培模式 选择云南绿秆蒌蒿，早熟苦瓜品种可选用早春1号白苦瓜、碧玉青苦瓜、种都牌长白苦瓜等。在蒌蒿采收后期及1月上旬进行苦瓜育苗，2月下旬～3月上旬定植，4月下旬～6月底采收苦瓜。


每667 m^2苦瓜产量2 000～2 500 kg，产值4 000元；蒌蒿总产量为3 400 kg（前4批），产值为12 000元；每667 m^2总产值16 000元。

·信息·

蜜本南瓜新品种汕美在海南试种成功

汕头市金韩种业有限公司最新培育的汕美蜜本南瓜新品种在海南试种成功。2009年3月10日，来自全国十多个省市的蜜本南瓜种子经销商及海南有关专家对10个不同品牌的蜜本南瓜进行田间性状鉴定，并对其品质进行现场品尝，新品种汕美南瓜综合性状表现最优，获得与会者的一致好评。

汕美南瓜由三个亲本杂交而成（三交种），其纯度高，杂种优势强，具有生长势旺盛、早熟、果实转色快、着色均匀、品质佳、易坐果、耐寒、果实不易变形、抗白粉病、避瓜实蝇为害的特点。该品种第1雌花始于第12节，雄花早于雌花5天开放。单株平均结两个果，平均单果质量2.3 kg，最大达4.3 kg。每667 m^2产量2 500 kg以上。果长28 cm，横径15 cm，果实短柱形，头尾匀称，腹腔小，比重大。果肉金黄色，具有甜、香、粉（面）的板栗型口感，品质佳。



蜜本南瓜在海南年播种面积1.6万 km^2以上，是海南重要的北运蔬菜，汕美新品种的推广应用将对海南冬季蔬菜生产产生积极的影响。

林师森
（海南大学园艺园林学院，海口 570228）

© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net